Universitätsklinikum Würzburg



Klinik und Poliklinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie Direktor: Prof. Dr. med. Sebastian Walther





LABOR FÜR THERAPEUTISCHES DRUG MONITORING VON PSYCHOPHARMAKA

Margarete-Höppel-Platz 1, 97080 Würzburg





KINDER/ JUGENDI ICHE



| OA Hr. Prof. Dr. med. DP Unterecker Tel.: 0931-201 77545 OA Hr. Dr. med. Ziegler Tel.: 0931-201 76590 | | | | O. Te | el.: 0931-201 | r. med. Tau 76451 med. Feket | | Massenspel | ktrometrie | Fr. PD Dr. Tel.: 0931-2 Hr. Burge Tel.: 0931-2 Fax: 0931-2 | rer. nat. S 201 76317 er 201 77260 | cherf-Cla | vel | |
|--|--|-------------------------------|--------------------|--|---------------------|--|---------------------|--------------|--|--|---|-------------------------------|---------|--|
| Patient | | | | | Einsender TDM-Labor | | | | | | | | | |
| | Gescl | nlecht | Klinik/St | ation/Praxi | | | | | LAURIS - Etikett | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| ☐ Gesetzlich | Selbstzah | ler | Telefonnummer | | | | | | | | | | | |
| | COIDOLEGII | | | chen | Infe | nkt | t Leber | | | Niere | | | | |
| Diagnose (ICD-10) | | | | | ☐ ja ☐ nein | | Infekt ☐ ja ☐ nein | | _ | _ | | path. o.B. | | |
| | | | | | | | | | ☐ pat | | | | 0.Б. | |
| Schweregrad der Erkrankung (CGI) (aktuell) | | | | | | Therapie-Effekt (CGI) (seit Behandlungsbeginn) | | | | | | | | |
| nicht beurteilbar (0) mäßig kra | | | | | | □ nicht beurteilbar (0) □ unverändert (4) | | | | | | (E) | | |
| nicht krank (1) | krank (5) | | | sehr viel besser (1) etwas schlechter (5) | | | | | | (5) | | | | |
| Grenzfall (2) schwer kr | | | | , (7) | | □ viel besser (2) □ viel schlechter (6) □ nur wenig besser (3) □ sehr viel schlechter (7) | | | | | | | | |
| leicht krank (3) | extrem schwer krank (7) | | | | | | | | | | | | | |
| Nebenwirkung(en) | Art der Nebenwirkung(en) | | | | | | | | | | | 144 (= 11) | | |
| ☐ keine | □ Schläfrigkeit/Sedierung □ EPS-Nebenwirkungen (Dystonie/Rigidität/Hypokinese/Akinese/Tremor/Akathisie) □ ZNS-NW (Delir) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | kuläre Störung (orthostatische Dysregulation/Tachykardie) stinale Störungen (Übelkeit/Erbrechen/Nausea/Diarrhoe/Obstip: | | | | | ☐ Hauterscheinungen on) ☐ Polydipsie | | | |
| schwer | _ | • | | Störungen (Miktionsstörung/sexuelle Dysfunktion | | | | | | | kuna | | | |
| Begleitmedikamente d | Akkomodatio | | | | | (| | | | | | | 9 | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| Keine | | | | | | Antilon, | | | | | | | | |
| Antidepressiva (ng/ml) | | | | | | psychotika (ng/ml) 100-320 ☐ Olanzapin ① 20-80 | | | Antikonvulsiva (μg/ml) □ Brivaracetam 0,5-0,9 □ Phenobarbital 10-40 | | | | | |
| ☐ Amitriptylin 80-200 ☐ Mirtazapin 30-80 ☐ Bupropion 850-1500 ☐ Moclobemid 300-1000 | | | _ | ☐ Amisulprid☐ Aripiprazol | | □ Olanzaj□ Paliperio | | | ırbamazepi | _ | Phenytoin 10-20 | | | |
| ☐ Bupropion 850-1500 ☐ Moclobemid 300-1000 ☐ Citalopram 50-110 ☐ Nortriptylin 70-170 | | | I _ · · · | ☐ Aripiprazol☐ Benperidol☐ | | □ Perazin | | | nosuximid | in 4-12 40-100 | □ Prega | | 2-5 | |
| ☐ Clomipramin 1 230-450 ☐ Opipramol 50-5 | | | ☐ Bromperidol | | 1-10 12-15 | | nazin 0,6-2, | | | 2-20 | ☐ Primic | | 5-10 | |
| | | | ☐ Cariprazin | | 10-20 | • | eron 100-40 | | ☐ Gabapentin 2-20 ☐ Lacosamid 1-10 | | | Rufinamid 5-30 | | |
| · · | | 20-65 10-150 | ☐ Chlorprothixen ● | | | □ Quetiap | | | ☐ Lamotrigin 3-15 | | | ☐ Sultiam 2-8 | | |
| ☐ Escitalopram 15-80 ☐ Tianeptin 30-80 | | | ☐ Clozapin | | 350-600 | Risperio | | | vetiracetan | | ☐ Topiramat 2-10 | | | |
| | | | ☐ Flupentixol | | 0,5-5,0 | □ Sulpirid | | | carbazepii | | • | insäure 50 | | |
| ☐ Fluvoxamin 60-230 ☐ Trazodon 700-1000 | | | ☐ Fluph | | 1-10 | ☐ Ziprasid | | | | | | | 10-40 | |
| ☐ Imipramin 175-300 ☐ Trimipramin 150-300 | | | ☐ Halop | eridol | 1-10 | ☐ Zuclope | enthixol 4-50 | 0 | AD(H)S-Therapeutika (ng/ml) | | | | | |
| ☐ Maprotilin 75-130 ☐ Venlafaxin 100-400 | | | Levor | nepromaz | in 30-160 | 0-160 | | | ☐ Atomoxetin 2 200-100 | | | ☐ Methylphenidat 0 2 3 | | |
| ☐ Milnacipran 100-150 ☐ Desvenlafaxin 100-400 | | | ☐ Melpe | eron | 30-100 | 30-100 | | | ☐ Guanfacin | | | mit Rücksprache Labor! | | |
| 1 (1 1 () 1 | Tages- Stea | | | | Steady | | | | dikation | | | | | |
| zu bestimmende(s) Medikament(e) dosis | | | | ate | Adher- | Dosisän- | Inter- | Neben- | Neuein- | Nichtan- | Verlaufs- | Anderer | Intoxi- | |
| retardiert oder Depot | mit angeben | mg | Ja | Nein | ence | derung | aktion | wirkung | stellung | sprechen | kontrolle | Grund | kation | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | + | | | | | l | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Entnahme vor Gabe | | | | novette | ohne Gel | ne Gel | | | Entnahme hier 2h nach Gabe (Cmax) | | | | | |
| jedoch min 12h nach | | erummonovette <u>ohne</u> Gel | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | S sofort kühlen, nicht einfrieren | | | | | |
| Schweigepflichtentbindung und Einverständnis nach der DSGVO des Patienten zur Übermittlung des Kumulativbefundes ist erteilt | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Datum | | | | Uhrzeit | | | | Unterschrift | | | | | | |
| (Blutentnahme) | (Blutent | (Blutentnahme) | | | | | | | | | | | | |