



Aktuelle Resistenzanteile empfohlener Antibiotika zur kalkulierten Therapie der ambulant erworbenen unkomplizierten Zystitis (Region Südost)

Antibiotikum/ Antibiotikaklasse		Unkomplizierte HWI			
		Nicht-rezidivierende HWI		Rezidivierende HWI	
		Resistenzanteil	95% KI	Resistenzanteil	95% KI
Erste Wahl *	Fosfomycin	2,2 %	0,8 - 6,3	1,0 %	0,2 - 5,6
	Nitrofurantoin	0,0 %	0,0 - 1,9	0,7 %	0,1 - 3,9
	Nitroxolin	0,5 %	0,1 - 3,0	0,7 %	0,1 - 4,1
	Pivmecillinam	4,0 %	2,0 - 7,7	3,5 %	1,5 - 8,0
	Trimethoprim	14,6 %	10,4 - 20,2	18,4 %	12,9 - 25,6
Zweite Wahl *	Cefpodoxim	4,5 %	2,0 - 10,2	3,4 %	1,2 - 9,7
	Ciprofloxacin	5,0 %	2,7 - 8,9	14,9 %	10,0 - 21,7
	Cotrimoxazol	10,9 %	7,3 - 16,0	16,3 %	11,1 - 23,3
	Levofloxacin	7,6 %	3,7 - 14,9	18,5 %	10,4 - 30,8
	Norfloxacin	8,9 %	4,6 - 16,6	18,5 %	10,4 - 30,8
	Ofloxacin	NA	—	NA	—

- Antibiotikum empfohlen (Resistenzanteil <5 %)
- Antibiotikum empfohlen (Resistenzanteile ≥5 - <15 %)
- Antibiotikum empfohlen (Resistenzanteile 15 - 20 %)

- Antibiotikum als zweite Wahl empfohlen (Resistenzanteil <5 %)
- Antibiotikum als zweite Wahl empfohlen (Resistenzanteile ≥5 - <15 %)
- Antibiotikum bedingt als zweite Wahl empfohlen (Resistenzanteile 15 - 20 %)

- Antibiotikum nicht empfohlen (Resistenzanteil ≥20 %)
- Antibiotikum nicht empfohlen (Resistenzanteil ≥20 %)
- NA keine Daten

*Entsprechend Leitlinienprogramm DGU: Interdisziplinäre S3 Leitlinie: Epidemiologie, Diagnostik, Therapie, Prävention und Management unkomplizierter, bakterieller, ambulant erworbener Harnwegsinfektionen bei erwachsenen Patienten. Langversion 1.1-2, 2017 AWMF Registernummer: 043/044